

Prospect: Informații pentru utilizator/pacient

Alfacolin 1000 mg/4 ml soluție injectabilă

Colină alfoscerat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Alfacolin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Alfacolin
3. Cum să luați Alfacolin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Alfacolin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Alfacolin și pentru ce se utilizează

Alfacolin soluție injectabilă conține substanța activă denumită colină alfoscerat care este utilizat pentru a stimula funcțiile creierului. Alfacolin este utilizat, în special, pentru tratamentul următoarelor afecțiuni:

- sindrom psihoorganic datorat proceselor involutive și degenerative la nivelul creierului;
- consecințe ale insuficienței cerebrovasculare, cum ar fi deficiența cognitivă primară și secundară la vârstnici, caracterizată prin tulburări de memorie, confuzie, dezorientare, scăderea motivației, inițiativei și a capacității de concentrare;
- tulburări de comportament și emoționale la pacienții vârstnici: instabilitate emoțională, iritabilitate, indiferență față de mediul înconjurător;
- pseudodepresie la pacienții vârstnici.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Alfacolin

Nu luați Alfacolin:

- dacă sunteți hipersensibil (alergic) la colină alfoscerat sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă sunteți însărcinată (vezi punctul „Sarcina și alăptarea”).

Nu luați acest medicament dacă vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul înainte să luați acest medicament.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul înainte de a utiliza Alfacolin.

Dacă în timpul tratamentului apare greața, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Copii

Acest medicament nu este destinat pentru administrare la copii.

Alfacolin împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiunile cu alte medicamente.

Alfacolin împreună cu alimente, băuturi și alcool

Acest medicament poate fi administrat cu sau fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți însărcinată, încercați să rămâneți însărcinată sau dacă alăptați.

Administrarea acestui medicament în sarcină este contraindicată.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Trebuie să manifestați prudență în timpul conducerii vehiculelor sau în timpul altor activități care necesită concentrare crescută și/sau viteză a reacțiilor psihomotorii.

3. Cum să luați Alfacolin

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră.

Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Alfacolin se va administra de asistenta medicală sau medic. Medicamentul poate fi administrat intravenos (lent)sau prin injecție în mușchi. Dozele și durata tratamentului se stabilesc în mod individual de către medic.

Doza uzuală este de 1000 mg (1 fiolă) de colină alfoscerat pe zi, administrată intramuscular sau intravenos (lent).

Dacă luați mai mult Alfacolin decât trebuie

Deoarece medicamentul vi se administrează de către personalul medical, este puțin probabil să primiți o doză prea mare de Alfacolin. Dacă aveți impresia că vi s-a administrat o doză prea mare, discutați cu medicul dumneavoastră.

În cazul administrării unei supradoze este posibil să apară senzația de greață.

Dacă uitați să luați Alfacolin

Deoarece medicamentul vi se administrează de către personalul medical este puțin probabil să fie omisă o doză. Totuși, dacă aveți impresia că nu vi s-a administrat o doză, discutați cu medicul dumneavoastră sau asistenta medicală. Nu trebuie să vi se administreze o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În timpul tratamentului cu Alfacolin, puteți prezenta greață. Acest efect secundar poate necesita reducerea dozei.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Alfacolin

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Alfacolin

Substanța activă este alfosceratul de colină. O fiolă (4 ml) conține 1000 mg alfoscerat de colină.

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Alfacolin și conținutul ambalajului

Alfacolin se prezintă sub formă de soluție transparentă, incoloră sau de culoare slab galbuie.

Câte 4 ml soluție injectabilă în fiole din sticlă incoloră prevăzute cu inel de rupere. Câte 5 fiole în blister. Câte 1 sau 2 blistere și prospectul pentru utilizator/pacient în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Lekpharm SRL

str. Minskaya 2a, of. 301, or. Logoysk 223141,

Republica Belarus

Tel./fax: +375 1774 53801

e-mail: office@lekpharm.by

Fabricantul

Lekpharm SRL

str. Minskaya 2a, 2a/4, or. Logoysk 223141,

Republica Belarus

Acest prospect a fost aprobat în August 2023

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>