

PROSPECTUL PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Troxerutin 300 mg capsule

Troxerutinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect (vezi pct. 4).
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Troxerutin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Troxerutin
3. Cum să utilizați Troxerutin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Troxerutin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE TROXERUTIN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Troxerutin - este un medicament care are un efect benefic asupra edemului și inflamației, întărind pereții capilarelor datorită bioflavonoidei troxerutina pe care o conține.

Folosit pentru reducerea edemului și ameliorarea altor simptome (oboseala, greutate, edemuri și dureri de picioare, amorteli, furnicături) ale diverselor afecțiuni venoase cronice.

Se recomandă de utilizat împreună cu ciorapi elastic-compresivi.

Potrivit pentru utilizarea în tratamentul complex al ulcerelor varicoase, pentru ameliorarea simptomelor de hemoroizi, limfedem și retinopatie diabetică (leziuni oculare din cauza nivelului ridicat de zahăr din sânge, care duce la scăderea vederii sau orbire).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI TROXERUTIN

Nu utilizați Troxerutin:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- copiilor și adolescenților cu vârsta până la 18 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Troxerutin.

Trebuie să știți că acest medicament nu este eficient pentru edem asociat cu bolile hepatice, renale sau cardiovasculare. Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți boli sau probleme de ficat, rinichi sau inimă.

Troxerutin împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau puteți utiliza alte medicamente, deși Troxerutin nu are interacțiuni adverse cunoscute cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați sau credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, consultați-vă medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Sarcina

Nu există date privind efectele adverse sau negative ale troxrutinei asupra sarcinii și asupra nou-născutului. Medicamentul poate fi utilizat de femeile însărcinate după consultarea unui medic care a evaluat necesitatea utilizării sale.

Nu este recomandat să luați produsul în primele trei luni de sarcină.

Alăptarea

Troxerutina este excretată în laptele matern în cantități minime, care nu sunt considerate a provoca efecte adverse nou-născutului. Medicamentul poate fi utilizat de femeile care alăptează, după consultarea unui medic care a evaluat necesitatea utilizării acestuia.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Troxerutin nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Troxerutin conține lactoză monohidrat

Acest medicament conține lactoză monohidrat. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele categorii de zaharuri, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI TROXERUTIN

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze recomandate

Adulți și vârstnici

Insuficiență venoasă cronică și a complicațiilor acesteia; tratamentul simptomatic al hemoroizilor

Doza zilnică recomandată este de 2–3 capsule împărțită în 2-3 prize, în funcție de severitatea simptomelor clinice.

Efectul terapeutic este de obicei observat în două săptămâni de la începerea tratamentului.

Tratamentul trebuie oprit după ce simptomele și edemul au dispărut complet. În caz de recidivă, cursul tratamentului se repetă.

Retinopatie diabetică

Doza zilnică recomandată este de 6–10 capsule, împărțită în 2-3 prize.

Copii și adolescenți

Experiența privind utilizarea la copiii cu vârsta sub 18 ani este limitată, prin urmare administrarea acestui medicament nu este recomandată la această grupă de pacienți.

Mod de administrare

Capsulele se administrează în timpul mesei cu un pahar de apă.

Dacă utilizați mai mult Troxerutin decât trebuie

Dacă ați luat o doză mai mare decât cea recomandată, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră pentru sfaturi.

Dacă ați uitat să utilizați Troxerutin

Dacă ați omis o doză, luați-o cât mai curând posibil. Dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta ca de obicei. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată (omisă). Continuați să utilizați medicamentul conform recomandărilor medicului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Troxerutin poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În timpul tratamentului cu Troxerutin pot apărea următoarele efecte adverse:

Rare (pot apărea la mai puțin de 10 pacienți din 1000)

- dureri abdominale,
- disconfort,
- dispepsie,
- meteorism,
- diaree,
- erupții cutanate,
- mâncărime,
- urticarie.

Foarte rare (pot apărea la mai puțin de 1 pacien din 10000)

- șoc anafilactic,
- reacții anafilactoidice,
- reacții de hipersensibilitate
- amețeli,
- dureri de cap,
- echimoze (vânătăi mai mari),
- oboseală.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă, sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți despre aceasta medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TROXERUTIN

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalaj original.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Troxerutin

Substanța activă: troxerutină (*troxerutinum*). Fiecare capsulă conține troxerutină 300 mg.

Excipienți:

Compoziția conținutului capsulei: lactoză monohidrat, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, macrogol 6000;

Compoziția capsulelor de gelatină: gelatină, dioxid de titan (E171), oxid galben de fier (E172).

Cum arată Troxerutin și conținutul ambalajului

Capsule gelatinoase, cilindrice, de culoare ivory. Conținutul capsulei: pulbere de la culoare galbenă până la galben-brun cu prezență de aglomerate.

Câte 10 capsule în blistere din PVC/folie de aluminiu.

Câte 5 blistere împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

DANHSON-BG OOD, Bulgaria

26 Otets Paisiy Str.

2400 Radomir

Fabricantul

VETPROM AD, Bulgaria

26 Otets Paisiy Str.

2400 Radomir

Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>