

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

GorloIN 5 mg/1,5 mg comprimate de supt *Chlorhexidinum dihydrochloridum/Benzocainum*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine, sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este GorloIN și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați GorloIN
3. Cum să utilizați GorloIN
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează GorloIN
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este GorloIN și pentru ce se utilizează

GorloIN comprimate de supt este destinat pentru administrare locală pentru reducerea numărului de microorganisme în bolile inflamatorii ale cavității bucale (stomatită, gingivită, afte) și ale gâtului (amigdalită, faringită, laringită).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați GorloIN

Nu utilizați GorloIN:

- dacă sunteți alergic la clorhexidină, benzocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți răni sau ulcerații în cavitatea bucală și gât;
- dacă vi s-a spus că aveți niveluri scăzute ale enzimei plasmatice colinesterază;
- la copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați GorloIN, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Trebuie să știți că:

GorloIN comprimate de supt trebuie utilizat cu precauție și sub supraveghere medicală dacă aveți răni și ulcerații la nivelul mucoasei bucale și gâtului.

Utilizarea de lungă durată (mai mult de o săptămână) a medicamentelor care conțin clorhexidină poate duce la o colorare reversibilă a limbii și dinților.

Copii și adolescenți

Acest medicament nu este destinat utilizării la copii cu vârsta sub 6 ani.

GorloIN împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice medicamente din grupul sulfonamidelor sau aminosalicilaților. Benzocaina scade efectul acestor medicamente.

GorloIN împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu trebuie să consumați alimente sau băuturi timp de 30 de minute după administrarea acestui medicament.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, credeți că ați putea fi însărcinată sau intenționați să rămâneți însărcinată, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Până în prezent nu se cunosc contraindicații de utilizare a acestui medicament în timpul sarcinii și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu există date privind influența asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

GorloIN conține în calitate de excipient aspartam (E 951)

Din cauza conținutului de aspartam (E 951), acest produs nu trebuie utilizat la persoanele cu fenilcetonurie (o tulburare de metabolism moștenită care determină acumularea în organism a unui aminoacid numit fenilalanină).

3. Cum să utilizați GorloIN

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect, sau așa cum va spus medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze recomandate

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani

Câte 1 comprimat de câteva ori pe zi. Dacă este necesar, se poate administra un comprimat la fiecare 1-2 ore, până se atinge doza maximă de 8 pastile pe zi.

Administrarea la copii și adolescenți

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani

Până la 4 comprimate pe zi, administrate la intervale de câteva ore.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Acest medicament nu trebuie administrat la această grupă de vârstă.

Tratamentul trebuie inițiat odată cu apariția primelor simptome și continuat timp de 1-2 zile după ameliorarea simptomelor.

Mod de administrare

Pentru administrare bucofaringiană.

Comprimatele trebuie ținute în gură până la dizolvarea completă. Comprimatele nu trebuie înghițite!

Se recomandă evitarea consumului de alimente sau băuturi timp de 30 de minute după administrarea comprimatelor. Ultimul comprimat trebuie administrat înainte de culcare și cu cel puțin 30 de minute după spălarea dinților.

Dacă ați luați mai mult GorloIN decât trebuie

Dacă medicamentul este utilizat conform recomandărilor, probabilitatea supradozajului este minimă.

Semnele de supradozaj pot apărea numai în caz de ingestie a unei cantități mari de medicament. În acest caz, trebuie să cereți sfatul medicului.

Dacă ați uitat să luați GorloIN

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați omis o doză, luați-o la momentul stabilit a următoarei administrări.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Utilizarea pe termen lung poate duce la o modificare temporară a gustului și la o senzație de arsură și rigiditate a limbii.

Utilizarea pe termen lung (mai mult de o săptămână) a medicamentelor care conțin clorhexidină poate duce la colorarea dinților, care poate fi îndepărtată prin periajul dentar cu pastă de dinți. Este posibilă și colorarea reversibilă a limbii.

Rar se observă cazuri de efecte iritante locale și alergii de contact.

În cazuri foarte rare, de asemenea, sunt posibile reacții de hipersensibilitate generalizate care duc la șoc anafilactic (reacție alergică care pune viața în pericol).

Utilizarea benzocainei poate provoca tulburări ale sângelui la copiii mici (methemoglobinemie - formă patologică a hemoglobinei).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează GorloIN

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține GorloIN comprimate de supt

Substanțele active sunt: diclorhidrat de clorhexidină, benzocaină.

1 comprimat de supt conține: diclorhidrat de clorhexidină 5 mg, benzocaină 1,5 mg.

Celelalte componente sunt (excipienți): izomalt, macrogol 6000, aromă de mentă (mentol, mentonă, ulei esențial de mentă, maltodextrină, octenil succinat de amidon sodic (E 1450)), aspartam (E 951), stearat de magneziu.

Cum arată GorloIN comprimate de supt și conținutul ambalajului

Descrierea medicamentului

Comprimate de culoare albă sau aproape albă, rotunde, plate, cu incizie pe o parte și aromă de mentă.

Conținutul ambalajului

Ambalajul primar: 10 sau 12 comprimate de supt în blister din PVC/Al.

Ambalajul secundar: câte 1 sau 2 blistere a câte 10 comprimate de supt sau câte 2 blistere a câte 12 comprimate de supt împreună cu prospectul pentru consumator/pacient în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SOPHARMA AD
16 Iliensko Shosse Str.,
Sofia 1220, Bulgaria

Fabricantul

ADIPHARM EAD
130 Simeonovsko shose Blvd.,
Sofia, 1700, Bulgaria

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>