

Prospect: informații pentru consumator/pacient

Metro-Adnex-Injeel soluție injectabilă

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Metro-Adnex-Injeel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Metro-Adnex-Injeel
3. Cum să utilizați Metro-Adnex-Injeel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Metro-Adnex-Injeel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Metro-Adnex-Injeel și pentru ce se utilizează

Metro-Adnex-Injeel este un medicament homeopat, care se utilizează ca adjuvant în tratamentul complex al stărilor inflamatorii ale organelor reproductive la femei, menstruațiilor dureroase și durerilor la mijlocul ciclului menstrual.

2. Ce trebuie să știți înainte să UTILIZAȚI Metro-Adnex-Injeel

Nu utilizați Metro-Adnex-Injeel:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenționări și precauții

Dacă simptomele persistă sau se agravează, este necesar de a consulta un medic sau un profesionist din domeniul sănătății.

Preparatul conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, astfel încât poate fi considerat „lipsit de sodiu”.

Copii

Întrebați medicul sau farmacistul înaintea administrării acestui preparat copiilor.

Siguranța și eficacitatea produsului nu a fost demonstrată la copiii cu vârsta sub 12 ani.

Metro-Adnex-Injeel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Metro-Adnex-Injeel nu interacționează cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există informații disponibile privitor la administrarea preparatului în sarcină sau perioada de alăptare. Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării. Nu au fost raportate careva efecte adverse.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor acestui preparat.

3. Cum să utilizați Metro-Adnex-Injeel

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard:

Adulți (și copiii cu vârsta peste 12 ani): 1 fiolă de 1-3 ori pe săptămână.

Doza în stări acute sau doza inițială:

Adulți (și copiii cu vârsta peste 12 ani): 1 fiolă pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Durata unui curs de tratament: 1-4 săptămâni.

Mod de administrare

Preparatul poate fi administrat sub formă de injecție intramusculară, subcutanată, intradermală sau intravenoasă.

În funcție de derularea bolii și de starea pacientului, medicul poate modifica durata curei de tratament și modul de administrare.

Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă



A se manipula cu grijă. A se urma cu precauție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți capul fiolei sub un unghi, și loviți ușor/agitați astfel încât să se scurgă în jos soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat. Orice conținut rămas trebuie aruncat.

Dacă utilizați mai mult Metro-Adnex-Injeel decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor acestui preparat.

Dacă uitați să utilizați Metro-Adnex-Injeel

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Metro-Adnex-Injeel

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, au fost raportate următoarele reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) la persoanele care au utilizat Metro-Adnex-Injeel:

- apariția unor reacții alergice la locul de injecție.
- salivare abundentă.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Metro-Adnex-Injeel

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Metro-Adnex-Injeel

1 fiolă (1,1 ml soluție injectabilă) conține:

Substanțe active: Apis mellifica D10 1,1 mg; Apis mellifica D30 1,1 mg; Apis mellifica D200 1,1 mg; Cimicifuga racemosa D10 2,2 mg; Cimicifuga racemosa D30 2,2 mg; Cimicifuga racemosa D200 2,2 mg; Hydrargyrum bichloratum D10 1,1 mg; Hydrargyrum bichloratum D30 1,1 mg; Hydrargyrum bichloratum D200 1,1 mg; Lachesis D10 1,1 mg; Lachesis D30 1,1 mg; Lachesis D200 1,1 mg; Lachesis D1.000 1,1 mg; Liliium lancifolium D10 1,1 mg; Liliium lancifolium D30 1,1 mg; Liliium lancifolium D200 1,1 mg; Lycopodium clavatum D10 1,1 mg; Lycopodium clavatum D30 1,1 mg; Lycopodium clavatum D200 1,1 mg; Lycopodium clavatum D1.000 1,1 mg; Pulsatilla pratensis D10 1,65 mg; Pulsatilla pratensis D30 1,65 mg; Pulsatilla pratensis D200 1,65 mg; Pulsatilla pratensis D1.000 1,65 mg; Vespa crabro D10 1,65 mg; Vespa crabro D30 1,65 mg; Vespa crabro D200 1,65 mg.

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru injecții.

Cum arată Metro-Adnex-Injeel și conținutul ambalajului

Metro-Adnex-Injeel se prezintă sub formă de soluție injectabilă incoloră, transparentă, fără miros.

Conținutul ambalajului

Câte 1,1 ml de soluție injectabilă în fiolă. Câte 5 (5x1), 10 (5x2) sau 100 (5x20) fiole, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501485

e-mail: info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost aprobat în noiembrie 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>.