

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Flucold 750 mg/10 mg/60 mg pulbere pentru soluție orală

Paracetamol / Clorhidrat de fenilefrină / Acid ascorbic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să luați Flucold, cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 3 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce găsiți în acest prospect:

- Ce este Flucold și pentru ce se utilizează
- Ce trebuie să știți înainte să luați Flucold
- Cum să luați Flucold
- Reacții adverse posibile
- Cum se păstrează Flucold
- Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE FLUCOLD ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Flucold este un medicament împotriva răcelii și gripei care conține trei substanțe active:

- paracetamol care ameliorează durerea și reduce temperatura atunci când aveți febră;
- clorhidratul de fenilefrină este un decongestionant care desfundă nasul și sinusurile și vă ajută să respirați mai ușor;
- vitamina C (acidul ascorbic) ajută la înlocuirea pierderilor de vitamina C în primele stadii de răceală și gripă.

Flucold este un remediu folosit pentru ameliorarea simptomatică, pe termen scurt a gripei, stărilor febrile, frisoanelor și răcelilor comune, inclusiv a durerii de cap, durerilor în gât, disconfortului și durerilor musculare, congestiei nazale, sinuzitei precum și durerii și catarului nazal acut, asociate acesteia.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ LUAȚI FLUCOLD

Flucold conține paracetamol.

Dacă luați o cantitate prea mare de paracetamol vă puteți afecta grav ficatul.

Nu luați Flucold:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la paracetamol, clorhidrat de fenilefrină, vitamina C sau la oricare dintre celelalte componente ale Flucold (vezi pct. 6);
- dacă aveți tensiune arterială mare;
- dacă aveți o tiroidă hiperactivă (hipertiroidism);
- dacă suferiți de o boală a inimii ;
- dacă aveți diabet zaharat;
- dacă aveți feocromocitom (o tumoră în apropierea rinichilor);
- dacă aveți glaucom cu unghi închis (tensiune crescută la nivelul ochilor);

- dacă sunteți în tratament cu alte medicamente (de exemplu antidepresive de tipul inhibitori de monoaminoxidază-IMAO, inclusiv o perioadă de 2 săptămâni de la întreruperea tratamentului cu aceștia, beta-blocante) (vezi pct. Folosirea altor medicamente);
- dacă sunteți în tratament cu alte decongestionante simpatomimetice;
- dacă aveți intoleranță la unele categorii de glucide (conține zahăr);
- dacă luați orice alte medicamente pe bază de prescripție medicală sau disponibile fără prescripție medicală care conțin paracetamol pentru a trata durerea, febra, simptomele de răceală și gripă, sau medicamente pentru a vă ajuta să dormiți.

Citiți întotdeauna și urmați instrucțiunile de pe ambalaj și din acest prospect. Nu administrați copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Aveți grijă deosebită când luați Flucold

Nu depășiți doza zilnică recomandată.

Cereți sfatul medicului, înainte de începerea tratamentului cu acest medicament, dacă suferiți de vreuna din următoarele afecțiuni:

- dacă suferiți de boli de ficat sau de rinichi;
- dacă aveți greutatea sub cea normală sau sunteți subnutrit;
- dacă consumați regulat alcool etilic.

Este posibil să fie necesar să evitați complet utilizarea acestui produs sau să limitați cantitatea de paracetamol pe care o luați.

Cereți sfatul medicului, înainte de începerea tratamentului cu acest medicament, dacă suferiți de vreuna din următoarele afecțiuni:

- probleme ale prostatei sau dificultăți de urinare;
- afecțiuni ale vaselor de sânge (de exemplu sindromul Raynaud, care se poate manifesta sub formă de dureri la nivelul degetelor ca răspuns la frig sau stres), diabet zaharat, hipertiroidism;
- boală renală sau hepatică severă. Antecedentele de boală hepatică cresc riscul afectării hepatice datorate paracetamolului.
- infecție gravă, aceasta măbind riscul apariției acidozei metabolice.

Simptomele acidozei metabolice includ: respirație adâncă, rapidă, dificilă; greață, vărsături; pierderea poftei de mâncare. Contactați medicul imediat dacă aveți o combinație a acestor simptome.

- glaucom (tensiune crescută la nivelul ochilor);
- feocromocitom (o tumoră în apropierea rinichilor);
- sunteți însărcinată, încercați să rămâneți însărcinată sau alăptați.

Este necesară prudență la vârstnici și la pacienții hipertensivi deoarece fenilefrina poate crește tensiunea arterială.

Riscul hepatotoxicității paracetamolului este mai mare în caz de afectare hepatică pre-existentă, incluzând hepatita virală sau când sunt asociate alte medicamente cu potențial hepatotoxic sau alcool.

Dacă simptomele de răceală persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului.

Cereți sfatul medicului sau farmacistului dacă nu sunteți sigur dacă puteți lua acest medicament.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu luați Flucold:

- împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol;
- cu alte medicamente decongestionante (medicamente pentru ameliorarea congestiei, a nasului înfundat), pentru ameliorarea tusei sau pentru răceală;
- dacă sunteți în tratament cu antidepresive triciclice (amitriptilina) sau de tipul inhibitori de

monoaminoxidază sau beta-blocante folosite în tratamentul afecțiunilor cardiace și a tensiunii arteriale crescute (hipertensiunii arteriale).

De asemenea, înainte de a lua acest medicament, adresați-vă medicului sau farmacistului

- dacă luați warfarină, alte cumarinice sau alte medicamente pentru subțierea sângelui (anticoagulante);
- dacă luați metoclopramidă sau domperidonă (stimulează motilitatea stomacului și a intestinului subțire și au efecte împotriva vărsăturilor);
- dacă luați colestiramină (rășină fixatoare de acizi biliari pentru a trata valorile mari ale colesterolului din sânge);
- dacă luați medicamente pentru controlul presiunii sângelui, cum ar fi beta-blocante;
- dacă luați medicamente pentru tratarea depresiei, cum ar fi antidepressivul triciclic (amitriptilina);
- dacă luați digoxină sau medicamente similare pentru boli ale inimii;
- dacă luați medicamente care blochează sau stimulează senzația de foame.

Modificări ale rezultatelor unor analize de laborator

Dacă urmează să vi se facă analize spuneți medicului că urmați tratament cu Flucold deoarece paracetamolul poate influența rezultatele analizelor.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, solicitați sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua orice medicament, inclusiv Flucold.

Flucold nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau alăptării, cu excepția cazurilor în care medicul consideră acest lucru strict necesar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Substanțele active conținute în Flucold nu au proprietăți sedative.

Acest produs poate cauza amețeală. Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje dacă sunteți afectați de amețeală în timpul tratamentului cu acest medicament.

Informații importante privind unele componente ale Flucold

Flucold conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Flucold conține aspartam. Consultați medicul dumneavoastră dacă aveți o boală numită fenilcetonurie, deoarece aspartamul poate fi dăunător în această maladie.

3. CUM SĂ LUAȚI FLUCOLD

Pentru administrare orală.

Flucold se administrează sub forma unei băuturi calde.

Goliți conținutul unui plic într-o cană, adăugați apă fierbinte și amestecați bine. Adăugați apă rece în cazul în care este necesar.

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta de 12 ani și peste:

Doza recomandată este de un plic la fiecare 4 sau 6 ore, la nevoie. Nu luați mai mult de 5 plicuri în 24 de ore.

Intervalul minim între administrări trebuie să fie de 4 ore.

Luați întotdeauna cea mai mică doză eficientă pentru a vă ameliora simptomele. Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 7 zile, fără recomandarea medicului.

Nu administrați Flucold copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani, decât la recomandarea medicului.

A nu se depăși doza zilnică recomandată.

Dacă ați luat mai mult Flucold decât trebuie

Solicitați imediat consult medical chiar dacă nu aveți niciun simptom și explicați-i exact cât de mult ați luat. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce trebuie să faceți.

Este important să-i spuneți doctorului, chiar dacă vă simțiți bine. Dacă o persoană a luat prea mult paracetamol, există un risc serios de leziuni hepatice datorită întârzierii instituirii tratamentului. În caz de supradozaj se impune tratament medical imediat. Simptomele supradozajului constau în tulburări hepatice, gastro-intestinale, reacții alergice, dureri de cap, agitație, palpitații și creșterea tensiunii arteriale.

Dacă ați uitat să luați Flucold

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Flucold poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate în funcție de frecvență, utilizând următoarea convenție:

Foarte frecvente:	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare:	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare:	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută:	care nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacțiile adverse rare pot include:

- erupții trecătoare pe piele și alte alergii;
- creșterea tensiunii la nivelul ochilor;
- dificultăți de urinare (retenție urinară);
- perceperea supărațoare a bătăilor inimii (palpitații).

Reacții adverse foarte rare includ:

- scăderea numărului unor celule sanguine numite plachete (trombocitopenie);
- erupții trecătoare pe piele și alte alergii, inclusiv o reacție alergică bruscă de mare amploare care implică întregul organism numită anafilaxie;
- îngustarea căilor respiratorii datorită spasmului musculaturii (bronhospasm)
- afecțiuni ale ficatului;

Reacțiile adverse cu frecvență necunoscută pot include:

- creșterea tensiunii arteriale;
- dureri de cap (cefalee);
- senzație de amețală;
- incapacitatea de a dormi (insomnie);
- nervozitate
- vărsături, greață;
- diaree.

Încetați să mai luați Flucold și consultați medicul dacă observați următoarele reacții adverse care sunt rare:

- iritație a pielii, descuamare sau ulcere bucale;
- pierderea vederii, care se poate datora unei tensiuni crescute anormal la nivelul ochilor. Această reacție este posibil să apară la persoanele care au glaucom.
- vânătăie inexplicabilă sau sângerare neașteptată;

- dificultate la urinare. Această reacție poate apare la bărbații care au prostata mărită.
- dacă anterior ați avut dificultăți de respirație când ați luat aspirină sau alte antiinflamatoare nesteroidiene și acum aveți aceeași reacție la acest medicament.
- reacții alergice cum ar fi iritații ale pielii sau mâncărimi, însoțite uneori de probleme respiratorii sau umflarea buzelor, limbii, gâtului sau a feței;
- puls al inimii neobișnuit de rapid sau o senzație neobișnuită de bătăi rapide ale inimii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ FLUCOLD

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Flucold după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP.). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Flucold

Substanțele active din Flucold sunt paracetamol, acid ascorbic și clorhidrat de fenilefrină. Fiecare plic conține paracetamol 750 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 60 mg.

Celelalte componente sunt: amidon, aspartam, galben de chinolină, gluconat de calciu, acid citric anhidru, lactoză anhidră, citrat de sodiu, manitol, aromă de lămâie.

Cum arată Flucold și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de pulbere de culoare galben deschis, cu miros și gust de lămâie.

Este disponibil în cutii cu 5 sau 10 plicuri a câte 5 g pulbere pentru soluție orală.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Nabros Pharma Pvt. Ltd., India.
3rd Floor, Oriental House - II, Opp. Art Galary,
B/h British Library, Law Garden,
Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006, Gujarat

Fabricantul

Nabros Pharma Pvt. Ltd., India.
Survey No. 110/A/2, Amit Farm, Jain Upasraya,
Nr. Coca Cola Factory, N.H. No. 8, Kajipura- 387411, Dist: Kheda,
Gujarat State, India.

Acest prospect a fost aprobat în august 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>