

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

BANEOCIN 250 UI/5000 UI/g unguent

Zinc bacitracină / Sulfat de neomicină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Baneocin unguent și pentru ce se utilizează.
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Baneocin unguent.
3. Cum să utilizați Baneocin unguent.
4. Reacții adverse posibile.
5. Cum se păstrează Baneocin unguent.
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

1. Ce este Baneocin unguent și pentru ce se utilizează

Baneocin este un medicament antibacterian care se aplică la nivelul pielii. Acesta acționează prin distrugerea anumitor bacterii care determină afecțiuni ale pielii.

Baneocin unguent este utilizat în:

- infecții ale foliculilor piloși și infecții ale glandelor sudoripare
- tratamentul anumitor infecții și ulcerării de la nivelul pielii
- panariții
- tratamentul arsurilor suprainfectate
- tratamentul eczemelor, crăpăturilor și tăieturilor suprainfectate
- prevenirea infecțiilor apărute după intervenții chirurgicale la nivelul pielii.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Baneocin unguent

Nu utilizați Baneocin unguent:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la
 - bacitracină
 - neomicină
 - alte antibiotice aminoglicozidice (cum sunt gentamicina, amikacina)
 - oricare dintre celelalte componente ale Baneocin unguent.
- dacă trebuie să tratați răni adânci, deschise sau leziuni extinse ale pielii. În aceste cazuri, substanțele active ale Baneocin unguent pot fi absorbite în organism și pot determina reacții adverse cum sunt afectarea auzului, inclusiv pierderea auzului.
- dacă aveți afecțiuni severe ale inimii sau ale rinichilor.
- dacă ați avut anterior o afecțiune a urechii interne sau a organului care controlează echilibrul, aflat în interiorul urechii
- dacă timpanul dumneavoastră este perforat
- nu utilizați Baneocin unguent la nivelul canalului auditiv extern, la nivelul ochilor, la nivelul sânilor, în timpul alăptării
- la copii cu vârsta sub 2 ani.

Nu utilizați acest medicament dacă oricare dintre cele enumerate mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Baneocin unguent.

Atenționări și precauții

- Dacă aveți afecțiuni ale ficatului sau rinichilor (insuficiență hepatică sau renală). De asemenea, vă rugăm să urmăriți apariția oricărui semn care poate indica afectarea rinichiului (pierderea poftei de mâncare, sete excesivă, urinare în cantitate redusă, urme de sânge în urină) sau afectarea auzului (pierdere a auzului pentru sunete înalte, zgomote și senzație de presiune în urechi).
- În inflamațiile urechii medii (otite medii) de lungă durată, Baneocin unguent trebuie aplicat la nivelul urechii numai la recomandarea medicului.
- Când utilizați doze mai mari decât cele recomandate, mai ales în tratamentul ulcerelor varicoase. Dacă sunt absorbite prin piele cantități mari din acest medicament, există riscul să apară slăbiciune musculară. Dacă prezentați deja slăbiciune musculară (de exemplu dacă aveți miastenia gravis sau o afecțiune similară), starea dumneavoastră se poate agrava.
- Utilizarea îndelungată a antibioticelor poate determina apariția bacteriilor rezistente.
- Vă rugăm să urmăriți apariția semnelor de inflamație (senzație de căldură, înroșire, umflare, durere) sau de infecție fungică (cu ciuperci) apărute la nivelul leziunilor tratate.

Spuneți medicului dumneavoastră despre acestea sau despre orice altă modificare neobișnuită pe care o observați.

Baneocin unguent împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

În special, nu utilizați Baneocin unguent și spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

- **antibiotice și medicamente care elimină surplusul de apă din organism (diuretice)**
Medicamentele care influențează modul în care funcționează rinichii dumneavoastră, cum sunt antibioticele (de exemplu cefalosporinele sau alte antibiotice aminoglicozide) sau diureticele (de exemplu acidul etacrinic și furosemida), utilizate în același timp pot determina accentuarea efectelor Baneocin unguent asupra afectării auzului sau a funcției rinichilor.
- **somnifere, anestezice sau relaxante musculare**
Baneocin unguent poate accentua slăbiciunea musculară dacă este utilizat în același timp concomitent cu anestezicele, în timpul intervenției chirurgicale. Ca urmare, înaintea intervenției chirurgicale spuneți medicului dumneavoastră că utilizați Baneocin unguent.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă utilizarea Baneocin unguent la gravide și la femeile care alăptează.

Aplicarea la nivelul sânilor de Baneocin unguent în cazul femeilor care alăptează este contraindicată.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu se cunosc efectele Baneocin unguent asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi aparate și utilaje.

Baneocin conține lanolină

Lanolina poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Baneocin unguent

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii vârsta peste 2 ani

- Întindeți unguentul în strat subțire pe zona afectată de 2 până la 3 ori pe zi.
- Zona afectată poate fi acoperită cu un pansament.
- Evitați contactul cu ochii.

Suprafața tratată o dată nu trebuie să depășească 1% din suprafața corpului (comparativ cu suprafața palmei bolnavului).

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 7 zile.

Dacă utilizați mai mult Baneocin unguent decât trebuie

Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă ați utilizat mai mult decât trebuie din Baneocin unguent și, ca urmare, prezentați simptome care pot indica leziuni renale (pierdere a poftei de mâncare, senzație de sete intensă, urinare în cantitate redusă, urme de sânge în urină) sau afectarea auzului (pierderea auzului pentru sunete înalte, zgomote și senzație de presiune în urechi).

Dacă uitați să utilizați Baneocin unguent

Dacă uitați să utilizați unguentul, utilizați-l imediat ce vă amintiți. Nu utilizați mai mult unguent pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Baneocin unguent

Utilizați Baneocin unguent atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră sau farmacistul. Aveți nevoie de fiecare doză pentru a ajuta la combaterea infecției. Dacă întrerupeți utilizarea mai devreme decât v-a fost recomandat, există riscul ca o parte din bacterii să supraviețuiască și să determine revenirea infecției.

Dacă înghițiți accidental din medicament

Spuneți imediat medicului dumneavoastră și acesta vă va recomanda tratamentul necesar.

Dacă medicamentul v-a intrat din greșeală în ochi

Clătiți imediat ochii cu apă de la robinet. Adresați-vă medicului dacă continuați să prezentați disconfort.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pot să apară reacții alergice [mai ales după utilizare îndelungată (mai mult de 8 zile), sub pansament ocluziv sau la pacienții cu dermatită cronică]. Semnele unei reacții alergice pot include:

- înroșire, uscăre și descuamare a pielii
- erupție trecătoare pe piele, mâncărimi
- lipsa vindecării sau agravarea infecției de la nivelul leziunii.

Dacă prezentați aceste simptome ca urmare a aplicării Baneocin unguent, întrerupeți utilizarea și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În timpul aplicării pe suprafețe cu leziuni ale pielii, substanțele active absorbite în organism pot determina reacții adverse cum sunt:

- tulburări ale echilibrului
- afectare a auzului
- afectare a funcției rinichilor
- slăbiciune musculară.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Baneocin unguent

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Baneocin unguent

- *Substanțele active sunt* zinc bacitracina și sulfatul de neomicină.

Un gram unguent conține zinc bacitracină 250 UI și sulfat de neomicină 5000 UI.

- *Celelalte componente sunt* lanolină și parafină albă moale.

Cum arată Baneocin unguent și conținutul ambalajului

Baneocin unguent se prezintă sub formă de unguent omogen de culoare gălbuie, cu miros specific ușor.

Baneocin unguent este disponibil în cutie cu un tub de aluminiu conținând 20 g unguent.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricanții

Deținătorul certificatului de înregistrare

SANDOZ GmbH,

Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Fabricanții

Lek Pharmaceuticals d.d,

Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Salutas Pharma GmbH

Lange Goehren 3, 39171 Sülzetal, OT Osterweddingen, Germania

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>