

Prospect: Informații pentru consumator / pacient

Videyin 100 mcg (4000 UI) capsule moi

Colecalciferol (vitamina D₃)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Videyin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Videyin
3. Cum să utilizați Videyin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Videyin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Videyin și pentru ce se utilizează

Videyin conține substanța activă colecalciferol, care face parte din grupul vitaminelor, fiind cunoscută și sub denumirea de vitamina D₃.

Vitamina D reglează metabolismul calciului și fosfaților, care contribuie la mineralizarea adecvată și la creșterea scheletului. Este necesară pentru funcționarea glandelor paratiroide, a intestinului, rinichilor, de asemenea este implicată în funcționarea sistemului imunitar.

Deficitul de vitamină D poate apărea atunci când dieta sau stilul dumneavoastră de viață nu vă oferă suficientă vitamină D sau când organismul dumneavoastră are nevoie de mai multă vitamină D.

Videyin este utilizat pentru:

- prevenirea deficitului de vitamină D în malabsorbție;
- tratamentul rahitismului și osteomalaciei.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Videyin

Nu utilizați Videyin:

- dacă sunteți alergic la vitamina D sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți o valoare mare, anormală a calciului în sânge (hipercalcemie) sau urină (hipercalciurie);
- dacă aveți un exces de vitamină D (hipervitaminoza D);
- dacă aveți sarcoidoză (creșterea numărului de celule inflamatorii (granuloame) în diferite părți ale corpului, cel mai frecvent în plămâni, inimă și rinichi);

- dacă aveți insuficiență renală;
- dacă aveți pietre la rinichi și în alte părți ale sistemului urinar;
- dacă aveți tuberculoză;
- dacă aveți pseudohipoparatiroidism (o tulburare metabolică a glandelor paratiroide, în acest caz necesitatea în vitamina D poate fi mai mică din cauza tulburării sensibilității la vitamina D, ceea ce duce la un risc de supradozaj prelungit).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Videyin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Se recomandă o atenție deosebită când utilizați vitamina D₃:

- dacă sunteți imobilizat la pat;
- dacă sunteți tratat cu anumite medicamente pentru inimă (glicozide cardiace) sau diuretice tiazidice;
- dacă aveți boli ale inimii sau vaselor sanguine;
- dacă aveți insuficiență renală;
- dacă luați alte medicamente, care conțin vitamina D sau calciu.

În timpul utilizării medicamentului trebuie să luați în considerare aportul suplimentar de vitamina D (dacă luați în același timp și alte medicamente, care conțin vitamina D). De asemenea, pentru asigurarea necesarului individual în vitamina D₃ trebuie să luați în considerare toate sursele posibile de aport ale acestei vitamine.

Nu luați acest medicament împreună cu doze mari de calciu.

Dozele mari de medicament, utilizate pentru o perioadă lungă de timp, sau dozele de încărcare pot provoca hipervitaminoză D₃ cronică.

Întrerupeți tratamentul și adresați-vă la medic, dacă apar simptome de hipervitaminoză cum ar fi: oboseală, greață, diaree, eliminare de urină în cantitate mare.

În timpul tratamentului de lungă durată, medicul dumneavoastră vă va verifica periodic valorile calciului din sânge și urină și vă va monitoriza funcția rinichilor. Dacă este necesar, medicul dumneavoastră vă poate spune să reduceți doza sau să opriți tratamentul.

Copii.

Se utilizează la copiii de vârstă mai mare (care sunt capabili să înghită capsula), la indicația medicului.

Videyin împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Spuneți medicului dumneavoastră, dacă luați în special:

- fenitoină sau fenobarbital (utilizate în epilepsie);
- rifampicină, neomicină (utilizate în tratamentul infecțiilor);
- colestiramină (utilizată pentru reducerea colesterolului);
- laxative (medicamente care ajuta la ameliorarea constipației) cu conținut de ulei de parafină;
- diuretice tiazidice, de exemplu hidroclortiazidă (utilizate pentru a elimina excesul de apă din organism);
- glicozidele cardiace, de exemplu digoxină (utilizate în boli de inimă);

- remediile antiacide cu conținut de aluminiu sau magneziu (utilizate în caz de arsuri la stomac);
- ketoconazol (utilizat în infecții cu ciuperci);
- alte medicamente cu conținut de vitamina D, metaboliți sau analogi ai vitaminei D;
- medicamente care conțin doze mari de calciu sau fosfor;
- calcitonină, etidronat, pamidronat (utilizate pentru reducerea conținutului crescut de calciu);
- orlistat (utilizat pentru reducerea masei corporale);
- glucocorticoizi (medicamente pentru tratamentul alergiilor și inflamațiilor).

Videyin împreună cu alimente și băuturi

O dietă bogată în grăsimi poate crește absorbția vitaminei D₃, de aceea pe durata administrării medicamentului e necesar să respectați o dietă fără exces de grăsimi.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Dacă medicul dumneavoastră vă prescrie Videyin 4000 UI atunci, când sunteți gravidă, acordați o atenție deosebită respectării dozei prescrise de către medicul dumneavoastră, deoarece supradozajul cu vitamina D₃ poate prezenta un risc de apariție a retardului fizic și mental, precum și a bolilor de inimă și ochi la copilul dumneavoastră.

Alăptarea

Vitamina D și metaboliții săi se excretă în laptele matern, astfel în perioada de alăptare medicamentul se va utiliza doar la indicația medicului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Videyin nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Cu toate acestea, atunci când conduceți vehicule sau lucrați cu alte mecanisme, se recomandă să fiți deosebit de atenți, din cauza posibilității de a dezvolta reacții adverse din partea sistemului nervos, cum ar fi dureri de cap și somnolență.

3. Cum să utilizați Videyin

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulții și copiii de vârstă mai mare (care sunt capabili să înghită capsula) trebuie să administreze medicamentul pe cale orală, înainte sau în timpul mesei: capsula se va înghiți întregă, cu o cantitate suficientă de apă.

Doze

Prevenirea deficitului de vitamina D₃ în malabsorbție

Doza este determinată individual de medic. Doza recomandată este de 1 capsulă de 100 mcg (4000 UI vitamina D₃) pe zi.

Tratamentul rahitismului și osteomalaciei

Doza este determinată individual de medic, în funcție de evoluția și severitatea bolii.

Doza recomandată pentru tratamentul deficienței de vitamina D₃ la copii este de la 1000 UI până la 5000 UI pe zi.

Dacă medicul v-a prescris Videyin 100 mcg (4000 UI) capsule moi, administrați câte 1 capsulă pe zi.

Durata utilizării

Durata tratamentului depinde de evoluția și severitatea bolii și este determinată de medic individual.

Tratamentul rahitismului și osteomalaciei cauzate de deficitul de vitamina D₃ se prelungește timp de un an.

În caz de tratament de durată lungă sau continuu cu Videyin 100 mcg (4000 UI) capsule moi, medicul vă va determina periodic nivelul creatininei din sânge și nivelul de calciu în serul sanguin și în urină. Dacă este necesar, doza va fi ajustată în funcție de concentrația de calciu din serul sanguin.

Dacă utilizați mai mult Videyin

În caz de supradozaj cu vitamina D₃, adresați-vă unui medic.

Simptomele de supradozaj includ: slăbiciune musculară, pierderea poftei de mâncare, greață, vărsături, constipație, consum de lichide crescut, volum crescut de urină, somnolență, sensibilitate la lumină, pancreatită, eliminări nazale, creșterea temperaturii corpului, scădere a libidoului, conjunctivită, creșterea nivelului de colesterol, creșterea activității transaminazelor, tensiune arterială mare, bătăi neregulate ale inimii și probleme cu rinichii. Simptomele frecvente sunt: dureri musculare și articulare, dureri de cap, scădere în greutate.

În cazurile severe este posibilă opacifierea corneei (stratul anterior transparent al ochiului), mai rar se poate dezvolta edemul papilei nervului optic, inflamația irisului până la dezvoltarea cataractei (opacifierea cristalinului).

Se pot forma calculi în rinichi, calcificarea țesuturilor moi, cum ar fi a vaselor sanguine, inimii, plămânilor și pielii. Rar se dezvoltă icter (îngălbenirea albului ochilor și a pielii).

Medicul dumneavoastră va decide referitor la severitatea intoxicației și va stabili tratamentul necesar.

Dacă uitați să utilizați Videyin

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată, ci continuați administrarea așa cum v-a fost prescrisă.

Dacă încetați să utilizați Videyin

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

De obicei, la utilizarea dozelor recomandate nu apar reacții adverse.

Foarte rar, în cazul unei hipersensibilități individuale la medicament sau ca urmare a utilizării dozelor mari pe o perioadă îndelungată, poate apărea hipervitainoza D.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- reacții de hipersensibilitate, inclusiv urticarie, erupții cutanate, mâncărime, eliminări nazale, creșterea temperaturii corpului;

- creșterea nivelului de colesterol, scădere în greutate, consum de lichide crescut, transpirație excesivă;
- scăderea libidoului, tulburări psihice, depresie;
- dureri de cap, somnolență;
- conjunctivită, sensibilitate la lumină;
- bătăi neregulate ale inimii;
- tensiune arterială crescută;
- pierderea poftei de mâncare, greață, vărsături, constipație, gură uscată, formarea excesivă a gazelor în intestine, dureri abdominale, diaree, indigestie, inflamația pancreasului;
- activitate crescută a transaminazelor hepatice;
- dureri musculare și articulare, slăbiciune musculară;
- niveluri crescute de calciu în sânge și/sau urină, formare de calculi rinichi sau alte părți ale tractului urinar și calcifiere tisulară, acumularea în sânge a ureei peste limita normală (uremie), eliminarea unei cantități excesive de urină.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Videyin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Videyin

Substanța activă este colecalciferolul.

1 capsulă moale conține colecalciferol 100 mcg (vitamina D₃ – 4000 UI).

Celelalte componente sunt: acetat de α -tocoferol; trigliceride cu lanț mediu; învelișul capsulei: gelatină, glicerol.

Cum arată Videyin și conținutul ambalajului

Videyin se prezintă sub formă de capsule gelatinoase moi de formă ovală, cu sutură, de culoare galben deschis, umplute cu un lichid uleios incolor sau ușor gălbui.

Videyin este disponibil în cutii cu 3 sau 6 blistere a câte 10 capsule moi.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA Uzina de vitamine din Kiev,Ucraina,
str. Kopîlovskaya, 38, 04073, or. Kiev.

Tel.: (044) 461-03-08,

Fax: (044) 461-03-01.

Fabricantul

SA Uzina de vitamine din Kiev,Ucraina,
str. Kopîlovskaya, 38, 04073, or. Kiev.

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>